

Upotreba

Novalac 2 prelazno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehrambenim potrebama odojčeta nakon 6. meseca starosti. Deo je mešovite ishrane koja se u prvih šest meseci ne sme koristiti kao zamena za majčino mleko. Preporučuje se kao dohrana ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalac 1 početnog mleka za odojčad. Novalac 2 je izvor kalcijuma i vitamina D, koji su neophodni za normalan rast i razvoj kostiju kod dece. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre šest meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac 2 deo je široke linije proizvoda posebno prilagođenih da zadovolje prehrambene potrebe odojčeta. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece.

Novalac 2 mlijeke nakon dojenja primjereno je za posebne prehrambene potrebe za dojenčad nakon 6. mjeseca starosti. Dio je raznolike prehrane koja se u prvih šest mjeseci ne smije koristiti kao nadomjestak za majčino mlijeko. Primjeren je kao dopuna hrani ako dojenje nije dovoljno i kao nastavak hranjenja nakon uporabe mlijeka za dojenčad. Novalac 2 je izvor kalcija i vitamina D, koji su potrebni za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Odluka o započinjanju dopunske prehrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske prehrane i prije šest mjeseci starosti, može biti donesena samo na temelju savjeta zdravstvenih radnika neovisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Novalac 2 dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljenje prehrambenih potreba dojenčadi. Nakon 12 mjeseci starosti preporučamo prijelaz na Novalac 3, mlijeko nakon dojenja.

Važne napomene

Majčino mleko je najbolja hrana za odojče. Mleko Novalac 2 za ishranu odojčeta koristi se samo na osnovu preporuke stručnjaka iz oblasti medicine, ishrane, farmacije ili druge stručne osobe nezavisne od proizvođača hrane, odgovorne za zdravlje majke i deteta, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belancevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba Vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.

Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Mlijeko se koristi samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i djeteta. Poseban oprez pri uporabi mlijeka Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mlijeka i zuba vašeg djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	> 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	> 7,5
Broj obroka na dan / Broj obroka na dan	3*
Broj merica za priprav. jednog obroka / Broj mjerica za priprav. jednog obroka	7
Količina vode (mL) / Količina vode (mL)	210

* kao deo mešovite ishrane / kao dio raznolike prehrane

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite.

- Uvijek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od svetla.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake uporabe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu ambalaže.
Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Ne sadrži gluten. Sadrži **mleko i soju**.
Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.


Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenr Str. 49, 39576 Stendal, Nemačka. **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG; **Uvezeno iz:** Slovenije. **Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. **Uvoznici za Srbiju:** PHOENIX PHARMA d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijevski Bulevar 3, 11000 Beograd. **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH; **Uvoznik za BiH:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG.



3 831061 014890

od **6-12** meseca /
mjeseca starosti

RS: Prelazno mleko za odojčad
Dijetetski proizvod
BA: Mlijeko nakon dojenja
Dijetetski proizvod



Neto količina:
800 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 ml	% RV* / % PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	2075,2 kcal	269,8 64,4	/ /
Masti	23 g	3 1,4	/ /
- od toga zasićene	11,1	1,4	/
- od toga mononezasićene	5,9	0,8	/
- od toga polinezasićene	4,8	0,6	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	4,3	0,6	/
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	0,42	0,0546	/
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	61 g	7,9 1,9	/ /
- od toga šećeri	42,1	5,5	/
Proteini / Bjelancevine	11 g	1,4 0,35	/ /
So / Sol	0,375 g	0,05 0,0125	/ /
Vitamini			
Vitamin A	μg RE	450	58,5
Vitamin B1	μg	400	52
Vitamin B2	μg	800	104
Vitamin B6	μg	300	39
Vitamin B12	μg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	60	7,8
Vitamin D3	μg	8,1	1,1
Vitamin E	mg α-TE	8,7	1,1
Vitamin K1	μg	30	3,9
Niacin	mg	4,5	0,6
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3
Folna kiselina	μg	60	7,8
Biotin	μg	15	2
Minerali			
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5
Kalijum / Kalij	mg	620	80,6
Hloridi / Klorid	mg	415	54
Kalcijum / Kalcij	mg	635	82,6
Fosfor	mg	360	46,8
Magnezijum / Magnezij	mg	45	5,9
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8
Cink	mg	4,5	0,6
Jod	μg	95	12,4
Bakar	μg	400	52
Mangan	μg	35	4,6
Selen	μg	10	1,3
Fluorid	μg	<450	<59
Ostalo			
Holin / Kolin	mg	60	7,8

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos)

UPOZORENJE Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.

Broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije:

Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srpske:

Broj i datum rješenja u FBiH:

Sastojci

Obrano **mleko**, maltodekstrini, laktoza (**mleko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijum-karbonat, emulgator (**sojin** lecitin), kalijum-hidroksid, kalcijum-hlorid, trikalcijum-fosfat, vitamini (retinilacetat, tiamin-hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotemat), natrijum-hlorid, holin-bitaratarat, gvožđe-sulfat, L-triptofan, trikalijum-citrat, magnezijum-oksidi, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, kalijum-jodid, mangan-sulfat, natrijum-selenit.

Obrano **mlijeko**, maltodekstrini, laktoza (**mlijeko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), kalcijev karbonat, emulgator (**sojin** lecitin), kalijev hidroksid, kalcijev klorid, trikalcijev fosfat, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, L-askorbinska kiselina, kolekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotemat), natrijev klorid, kolin bitaratarat, željezov sulfat, L-triptofan, trikalijev citrat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.



1 Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuvajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijte u bočicu.



4 Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.



6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.