

Upotreba

Novalac Allernova AR je hrana za posebne medicinske namene. To je zgnusnuta hrana koja sadrži hidrolizovane belančevine iz kravljeg mleka (kazein), primenjena za odojčad i malu decu koja su preosetljiva na belančevine kravljeg mleka. Novalac Allernova AR je primenjena za odojčad i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti, ukoliko majka ne doji. Novalac Allernova AR zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti kao deo mešovite ishrane. Ne uvodite u ishranu Vašeg deteta druge mlečne obroke (dečje cerealijske sa mlekom, mlečne proizvode) bez prethodnog savetovanja sa lekarom. I Allernova AR je hrana za posebne medicinske potrebe. To je zgnusnuta hrana koja sadrži hidrolizovane belančevine iz kravljeg mleka (kazein) i je primenjena za dojenčad i malu decu preosetljivu na belančevine kravljeg mleka. Allernova AR primenjena je za dojenčad i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti, ako majka ne doji. Allernova AR zadovoljava sve prehranbene potrebe dojenčadi do 6. meseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 meseci prema preporuci lekara i do raznošlike prehrane. Ne uvodite u prehranu vašeg deteta druge mlečne obroke (dečje žitarice sa mlekom, mlečni proizvodi) bez prethodnog savetovanja sa ljecnikom.

Važna napomena

Dojenje je najbolji način ishrane za odojčad. Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad od 6. meseca starosti. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre 12 meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac Allernova AR ne sme se primenjivati u slučaju galaktosemije i malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Nije za parenteralnu upotrebu. Novalac Allernova AR nije prikladna za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba Vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka. I Majčino mleko najbolje je hrana za dojenčad. Novalac Allernova AR se mora uzimati pod nadzorom lekara. Proizvod nije primenjen za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. meseca starosti. Novalac Allernova AR se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac Allernova AR ne smije se primenjivati u slučaju malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Proizvod nije primenjen za parenteralnu upotrebu. Novalac Allernova AR nije prikladna za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Prilikom hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mlečne hrane i zuba vašeg deteta ne bude dugotrajn ili učestao jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 6	>6
Težina odojčeta / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	>7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	7
Količina vode (ml)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	210

*kao deo mešovite ishrane / *kao dio raznolikih prehrane

Napomene

- Uvek pripremite svjež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskoristili. Ostatak bacite.
- Uvek pripremite svjež obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepojedeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Sadržaj mleko. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. I Pakirano u kontrolisanoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal, Nemačka. **Zemlja porekla:** Nemačka. DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz Slovenije:** **Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija | **Uvoznici za Republiku Srbiju:** Phoenix Pharma d.o.o., Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; Vega d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirijevski bulevar 3, 11000 Beograd | **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 6286/2025 od 26.01.2025. godine

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenstr. 49, 39576 Stendal - Nemačka. | **Zemlja podrijetla:** Njemačka. DE ST 00217 EG. **Uvezeno iz Slovenije:** | **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmet Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH | **Uvoznici za BA:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. | **Broj i datum rješenja u FBiH:** Broj rješenja o upisu u Registar RS:



200.006730

MEDIS www.novalac.rs
www.novalac.ba

Novalac Allernova AR

RS: Hrana za posebne medicinske namene - Dijetetski proizvod

Za potrebe ishrane odojčadi i male dece koja su preosetljiva na belančevine kravljeg mleka sa regurgitacijom

BA: Mlijeko za dojenčad i malu djecu Hrana za posebne medicinske potrebe - Dijetetski proizvod

Za djetaltnu prehranu dojenčadi i male djece preosetljive na bjelančevine kravljeg mlijeka te koja imaju regurgitaciju



Neto količina:

400 g e

Nutritivne informacije

		100 g	100 mL	%RV*/ %PU/100 mL
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ	2075	280	/
	kcal	496	67	/
Masti	g	26,2	3,5	/
- od toga zasićene masne kiseline	g	10,2	1,4	/
- od toga mononezasićene masne kiseline	g	9,5	1,3	/
- od toga polinezasićene masne kiseline	g	5,2	0,7	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,5	0,6	/
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	450	60,8	/
Ugljikohidri / Tjegljiuhidri	g	52,7	7,3	/
- od toga šećeri	g	0	0	/
Proteini / Bjelančevine	g	12,1	1,6	/
So / Sol	g	0,575	0,08	/
Vitamins				
Vitamin A	µg RE	450	60,8	15
Vitamin B1	µg	400	54	11
Vitamin B2	µg	800	108	15
Vitamin B6	µg	300	40,5	6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2	25
Vitamin C	mg	60	8,1	18
Vitamin D3	µg	7,5	1	14
Vitamin E	mg α-TE	11	1,5	30
Vitamin K1	µg	30	4,1	34
Niacin	mg	4,5	0,6	9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3	10
Folna kiselina	µg	66	8,1	7
Biotin	µg	15	2	20
Minerali				
Natrijum / Natrij	mg	230	31,1	8
Kalijum / Kalij	mg	650	87,8	9
Hlorid / Klorid	mg	340	45,9	9
Kalcijum / Kalcij	mg	520	70,2	13
Fosfor	mg	300	40,5	7
Magnezijum / Magnezij	mg	30	6,8	9
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8	10
Cink	mg	4	0,5	10
Jod	µg	70	9,5	12
Bakar	µg	350	47,3	9
Mangan	µg	50	6,8	1
Selen	µg	10	1,4	7
Fluorid	µg	<350	<48	/
Hrom / Krom	µg	<45	<7	/
Vanijum	µg	<45	<7	/
Ostalo				
Inozitol / Kolin	mg	60	8,1	/
Inozitol	mg	25	3,4	/
Taurin	mg	44	5,9	/
L-karnitin	mg	8	1,1	/

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad | *PU (preporučeni unos) | Osmolaritet: 189 mOsm/L. **UPOZORENJE:** Novalac Allernova AR je zgnusnuta formula, koju je potrebno pre upotrebe muckati duže nego što je to uobičajeno. Zbog posebnog sastava izgled, miris i ukus u flašici mogu biti drugačiji u odnosu na standardno mleko. Upotreba mleka Novalac Allernova AR može biti uzrok i malo meke i/ili zelenkaste stolice, bez dodatnih neprijatnosti za odojčad. Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikuje se oštećenje zdravlja deteta. I Allernova AR je zgnusnuta formula koju ćete prije upotrebe trebati muckati duže nego što je to uobičajeno. Zbog posebnog sastava izgled, miris i ukus u bočici mogu biti drugačiji u odnosu na standardno mleko. Može prouzročiti i nešto manje tvrdu i/ili zelenkastu stolicu bez nelagodje za dojenčad.

Sastojci

Maltodekstrin, biljna ulja (palmino, ulje uljane repice, sunčokretovo, kokosovo), kukuruzni skrob, hidrolizovane mlečne belančevine, trikalcijum-fosfat, emulgator (sunčokretovo lecitin), trikalcijum-citrat, magnezijum-hlorid, kalijum-hlorid, L-cistin, vitamin E (retinilat), DL-α-tokoferylacetat, tiamin-hidrohlorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, L-askorbinska kiselina, holokalciferol, DL-α-tokoferylacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilomnoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantonat, kalcijum-fosfat, holin-bitartrat, L-tryptofan, taurin, kalijum-hlorid, gvožđe (III-sulfat), inozitol, cink-sulfat, L-karnitin, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), natrijum-selenit, bakar-sulfat, kalijum-jodid, mangan-sulfat. / Maltodekstrin, biljno ulje (palmino, ulje uljane repice, sunčokretovo, kokosovo), kukuruzni škrob, hidrolizirane bjelančevine iz mlijeka, trikalcijev fosfat, emulgator: sunčokretov lecitin, trikalcijev citrat, magnezijev klorid, kalcijev klorid, L-cistin, vitamin E (retinilat), DL-α-tokoferylacetat, tiamin-hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, L-askorbinska kiselina, holokalciferol, DL-α-tokoferylacetat, fitomenadiol, D-biotin, pterilomnoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev D-pantonat, kalcijev fosfat, holin-bitartrat, L-tryptofan, taurin, kalijev klorid, željezov sulfat, cinkov sulfat, L-karnitin, antioksidansi (ekstrakt obogaćen tokoferolima), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU



1. Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajte u vodi. Neka ključa bar 10 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuvajte u vodi. Neka ključa barem 10 minuta.



2. Vodu za pripremu obroka prokuvajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuvajte u pokrivenom lončicu. Neka ključa barem 5 minuta.



3. Vodu u posudi ohladite do 45 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončicu ohladite do 45 °C i prelijte je u bočicu.



4. Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Dodajte u bočicu preporučeni broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5. Flašicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promuckajte da se prašak potpuno otopi.



6. Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.